



မေးခွန်း

ကျွန်ုပ်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ဒုတိယအကြိမ် ထိုးပြီးပါပြီ။ နှာခေါင်းစည်း မဝတ်တော့ဘဲ ကျွန်ုပ်၏ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများ ဆီ အလည်သွားနိုင်ပြီလား။



မရသေးပါ။

သင့်ကိုယ်သင်၊ သင်ချစ်ရသူများနှင့် အခြားသူများကို ဘေးကင်းအောင်ထားရန် လိုပါသေးသည်။


ဆေးကို နှစ်လုံးလုံး ထိုးထားပြီးသည့်တိုင် အာနိသင်အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးများက ၉၅% သာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ ၅% ရှိနေသည့်သဘော ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူကြပါ။ အချို့လူများသည် အခြားသူများထက်စာလျှင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် ကိုယ်ခံအား ပို၍ကောင်းကြသည်။


သင်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အပြည့်အဝ ပြန်အလုပ်မလုပ်ခင် ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် နှစ်ပတ်မှ သုံးပတ်အထိ ကြာတတ်သည်ကို သတိပြုပါ။



အဝတ်ဖြင့်လုပ်ထားသော မျက်နှာအကာကို ဝတ်ဆင်ပါ။



အမြဲတမ်း အခြားသူများနှင့် အနည်းဆုံး ၆ ပေ ခွာပြီး စောင့်ဆိုင်းပါ။



သင့်လက်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါ သို့မဟုတ် လက်သန့်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပါ။

ဆေးနှစ်လုံးလုံး ထိုးပြီးသည့်တိုင် မိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်ပြီး မည်သည့်လက္ခဏာမျှ မပြခြင်း ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် နှာခေါင်းစည်းကို ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ပြီး သင့်လက်ကို ဆေးကြောကာ လူကြားထဲတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းကို လိုက်နာပြီး အခြားသူများကို ကာကွယ်ရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။

www.orangecountync.gov/getyourshot
(919) 245-6111

